



Mesures en cas d'accident avec exposition au sang

Utilisez des gants à usage unique en cas de risque de contact avec le sang

Contamination par le sang

à partir d'un sujet éventuellement porteur

- de l'hépatite B
- de l'hépatite C
- du VIH

Matériel : - Bétadine dermique ou DAKIN COOPER ou Alcool à 70°

Il faut qu'il y ait contact entre le sang du sujet porteur de la maladie et les muqueuses ou une plaie du secouriste.

En cas de piqûre ou coupure par du matériel souillé :

- Ne pas faire saigner la plaie;
- Laver à l'eau et au savon pendant 5 minutes ;
- Appliquer une compresse imbibée de Bétadine Dermique (ou DAKIN COOPER, ou Alcool 70°) sur la plaie pendant 15 minutes.

En cas de projection de sang sur une peau lésée :

- Laver abondamment à l'eau et au savon pendant 5 minutes ;
- Appliquer une compresse imbibée de Bétadine Dermique (ou DAKIN COOPER, ou Alcool 70°) pendant 15 minutes.

En cas de projection oculaire :

- Laver à l'eau courante, tiède, douce, pendant 10 minutes, en réalisant un ruissellement.

Dans tous les cas :

1. Consultation médicale obligatoire aux Urgences dans les 4 heures, penser à amener le carnet de vaccinations ;
2. Faire établir une déclaration " Accident de Travail " ;
3. Avertir le Médecin du Travail.